

**Инструкция по применению
средства дезинфицирующего (кожного антисептика)
«МАСТЕРСЕПТ»**

№ ИП 9392-029-70743339-2011

Торговое название:	МАСТЕРСЕПТ
Состав:	изопропанол (55%), алкилдиметилбензиламоний хлорид (0,15%), эфирное масло лаванды, другие функциональные компоненты, рН средства - $7,1 \pm 0,5$.
Описание:	Прозрачная бесцветная жидкость с характерным запахом.

АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ

Средство «МАСТЕРСЕПТ» обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных (в т.ч. возбудителей туберкулеза - тестировано на *M. terrae*) и грамотрицательных бактерий, вирусов (в т.ч. возбудителей парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции), патогенных грибов-возбудителей кандидозов и трихофитии. Обладает пролонгированным антибактериальным действием не менее 3 часов.

НАЗНАЧЕНИЕ

В качестве кожного антисептика: обработка рук хирургов, оперирующего мед. персонала; обработка локтевых сгибов доноров; обработка операционного и инъекционного полей; обеззараживание перчаток; гигиеническая обработка рук; частичная санитарная обработка кожных покровов. **В качестве дезинфицирующего средства:** дезинфекция различных твердых поверхностей и объектов, устойчивых к действию спиртов, согласно инструкции по применению №5/11 от 21.12.2011.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лечебно-профилактические организации любого профиля; лаборатории; предприятия химико-фармацевтической и биотехнологической промышленности; зоны ЧС; учреждения соц. обеспечения; пенитенциарные учреждения; коммунально-бытовые объекты; объекты общественного транспорта; спортивно-оздоровительные учреждения; предприятия общественного питания, торговли, рынки; население в быту.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Гигиеническая обработка рук: 1) 2-3 мл средства наносят на сухие кисти рук (возможно без предварительного мытья водой с мылом) и тщательно втирают в кожу до высыхания (20-30 секунд); 2) орошают кисти рук до полного увлажнения (2-3 мл средства) из аэрозольной упаковки (возможно без предварительного мытья водой с мылом), затем тщательно втирают в кожу до высыхания (20-30 секунд). **Обработка рук хирургов:** перед применением средства кисти рук и предплечья предварительно двукратно моют теплой проточной водой с мылом (например, «Бетафлор», «Дезафлор») в течение 2 минут, высушивают стерильной марлевой салфеткой. Затем на кисти рук наносят 3 мл средства и втирают его в кожу рук и предплечий в течение 1,5 мин; процедуру повторяют. Стерильные перчатки надевают после полного высыхания средства.

Обработка кожи локтевых сгибов доноров и операционного поля, в т.ч. перед введением катетеров, пункцией суставов: кожу последовательно двукратно протирают отдельными стерильными марлевыми тампонами, обильно смоченными средством. Время выдержки - 2 минуты. **Обработка инъекционных полей, в т.ч. при введении периферических катетеров:** кожные покровы протирают (однократно, в одном направлении) стерильным ватным тампоном, обильно смоченным средством, либо орошают из аэрозольной упаковки. Время выдержки - 1 минута. **Частичная санитарная обработка кожных покровов (в т.ч. ступней ног с целью профилактики грибковых заболеваний):** обильно смочить ватный тампон (3-5 мл на каждый тампон) и тщательно обработать каждую ступню ног, либо участки кожных покровов, подлежащие дезинфекции, отдельными ватными тампонами/салфетками, смоченными средством. Время выдержки после обработки участка кожных покровов, подлежащего дезинфекции - 2 минуты. Время выдержки после обработки ступней ног - 3 минуты. **Обеззараживание перчаток, надетых на руки персонала:** наружную поверхность перчаток тщательно протирают стерильным ватным или марлевым тампоном, обильно смоченным средством (3-5 мл на тампон) в течение 1 минуты. Время выдержки - 5 минут. При инфицировании перчаток возбудителями туберкулеза проводится однократная обработка, время выдержки - 15 минут. При наличии видимых загрязнений кровью перчатки после обработки средством следует заменить.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Только для наружного применения. Не наносить на раны и слизистые оболочки. Избегать попадания в глаза. Не вдыхать пары. Не допускать контакта с открытым пламенем и включенными нагревательными приборами. Легко воспламеняется! Не курить.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Побочного действия и противопоказаний к применению не выявлено. По параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу мало опасных соединений. Не обладает местно-раздражающими и резорбтивными свойствами при контакте с кожными покровами. Сенсибилизирующие свойства не выражены.

Форма выпуска:

Полиэтиленовый флакон по 100, 200, 450, 500 мл со специальной насадкой.

Условия хранения:

В сухих, защищенных от света и недоступных для детей местах, вдали от нагревательных приборов и открытого огня, отдельно от лекарственных средств, при температуре от -5°C до +30°C.

Срок годности:

3 года от даты изготовления.

Условия отпуска из аптек:

Без рецепта врача.

ООО «МЕДЛЕКСПРОМ», Россия,

350010, г. Краснодар, ул. Зиповская 5, корп. 33

тел./факс: (861)279-10-00, e-mail: info@medlex.ru, www.medlex.ru

Изготовлено по ТУ 9392-029-70743339-2011

Свид-во о гос.рег.: RU.77.99.88.002.E.011556.12.14 от 02.12.2014